

大腸癌化学療法スケジュール表

健和会大手町病院外科

No.2

TS-1 + アバスチン BV 療法

薬剤	月/日									
	コース		コース		コース		コース		コース	
	/		/		/		/		/	
	<input type="checkbox"/> 入院 <input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 入院 <input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 入院 <input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 入院 <input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 入院 <input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 入院 <input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 入院 <input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 入院 <input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 入院 <input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 入院 <input type="checkbox"/> 外来
ティーエスワン 内服	○	→	○	→	○	→	○	→	○	→
① 前投薬	○		○		○		○		○	
② アバスチン	○		○		○		○		○	
③ 生食	○		○		○		○		○	

薬剤	月/日									
	コース		コース		コース		コース		コース	
	/		/		/		/		/	
	<input type="checkbox"/> 入院 <input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 入院 <input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 入院 <input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 入院 <input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 入院 <input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 入院 <input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 入院 <input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 入院 <input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 入院 <input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 入院 <input type="checkbox"/> 外来
ティーエスワン 内服	○	→	○	→	○	→	○	→	○	→
① 前投薬	○		○		○		○		○	
② アバスチン	○		○		○		○		○	
③ 生食	○		○		○		○		○	

◎ ティーエスワンの消化器症状(悪心、食思不振)副作用対策

→ ラフチジン(H2拮抗薬)の併用。胃散産抑制効果に加えて胃粘液産生作用、消化管粘膜保護作用を
Rp. プロテカジン10mg 2錠 2 × 朝、夕食後

◎ Bevacizumab アバスチン

※ 血管内VEGFを阻害することで、腫瘍組織での血管新生を抑制し、抗腫瘍効果を発揮する分子標的治療薬

※ 可能性のある特徴的な副作用

- 消化管穿孔 ■創傷治癒遅延 ■出血(腫瘍性出血、鼻出血、歯肉出血、腔出血など)
- 血栓塞栓症 ■高血圧 ■可逆性後白質脳症症候群(痙攣発作、頭痛、視覚障害など)

抗がん剤治療を受けられる方へ
＜化学療法治療計画書および同意書＞

様

健和会大手町病院外科・消化器科


大腸癌の治療に対して貴方の受けられる治療は、
ティーエスワン+ アバスチン 療法です

◎抗がん剤注射の前に吐き気を押さえる点滴をします
アロキシ(制吐剤) + デキサート(ステロイド) 30分点滴

◎この治療に使われる抗がん剤

①ティーエスワン (TS-1)	内服	内服抗癌剤
③アバスチン (ペバシズマブ)	点滴	分子標的抗癌剤

◎抗がん剤投与スケジュール(1クール)



◎主な副作用

- ◆骨髄抑制(白血球減少、好中球減少)
- ◆悪心・嘔吐
- ◆食欲不振
- ◆脱毛

#**ティーエスワン**

- 下痢
 - 食思不振
 - 口内炎
- プロテカジンとの併用で症状軽減
- 骨髄抑制

#**アバスチン**

- 消化管穿孔
- 創傷治癒遅延
- 出血(腫瘍性出血、鼻出血、歯肉出血、腔出血など)
- 血栓塞栓症
- 高血圧
- 可逆性後白質脳症症候群(痙攣発作、頭痛、視覚障害など)

※副作用症状が軽度の場合は、十分な注意の上治療を継続いたします。
※副作用が強く急激な変化を認めた場合は、中止もしくは延期いたします。

説明日 年 月 日

説明医師 _____ 担当看護師 _____

この抗がん剤治療に関して、必要性、スケジュール内容、副作用を十分理解の上、治療を受けることに同意いたします。

同意日 年 月 日 患者様氏名 _____