

疾患名（がん腫）	胃がん
----------	-----

療法（レジメン）名	ニボルマブ+SOX
-----------	-----------

番号	抗がん剤（商品名）【略語】	投与法	1日投与量	（上限値）
1	生食50mL（ルート確保）	点滴 5分		
2	ニボルマブ（オプジーボ） 360mg/body 生食 100mL	点滴 30分		
3	生食50mL（フラッシュ用）	15分		
4	パロノセトロン0.75mg デキサメタゾン6.6mg	30分		
5	オキサリプラチン130mg/m ² 5%ブドウ糖液 500mL	2時間		
6	生食50mL（フラッシュ用）	15分		
7	S-1 day1-14 服用。Day15-21は休薬。 BSA < 1.25 : 80mg/day 分2 (20mg 4cap 分2) 1.25 ≤ BSA < 1.5 100mg/day 分2 (25mg 4cap 分2) 1.5 ≤ BSA 120mg/day 分2 (20mg 6cap 分2)			
投与スケジュール		特有の副作用		
1コース21日間				

※投与量の単位：mg/m²、mg/body、mg/kg


※レジメンの妥当性を評価できる資料を添付の事(添付資料についての詳細は裏面に参照)


※投与スケジュール、特有の副作用については、該当する場合のみ記載

根拠文献：Lancet Oncol. 2022 Feb;23(2):234-247

ニボルマブ+SOX

フィルター付きルート

ルート1	ルート2	ルート3
①5分 (ルート確保) 注食 50mL		
②30分 オプジーボ 360mg		
③15分 (フラッシュ) 正糖50mL		
④30分 パロノセトロン デキサメタゾン		
		
	⑤2時間 オキサリプラチン 5%ブドウ糖	
⑥フラッシュ 注食 50mL		



フィルター付きルート

S-1 day1-14 服用。Day15-21は休薬。
 BSA<1.25: 80mg/day 分2 (20mg 4cap 分2)
 1.25≦BSA<1.5 100mg/day 分2 (25mg 4cap 分2)
 1.5≦BSA 120mg/day 分2 (20mg 6cap 分2)